prsalud

30 de enero de 2009

¿Cuántos diabéticos hay en España?

La Sociedad Española de Medicina Interna ha puesto en marcha un **estudio on line** de registro de **diabéticos tipo 2** atendidos en los servicios de medicina interna españoles, con el objetivo de conocer la incidencia real de esta patología, de la que el 50 por ciento de los pacientes se encuentra sin diagnosticar.

En el marco de la **III Reunión Anual de Diabetes y Obesidad**, en colaboración con la Sociedad Española de Diabetes (SED), el Grupo de Trabajo Corazón y Diabetes de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y el Grupo de Estudio de la Diabetes en la Atención Primaria de Salud (GEDAPS), el coordinador del Grupo de Trabajo de Diabetes y Obesidad de la SEMI, Ángel Sánchez, esta iniciativa permitirá conocer la incidencia real de la diabetes tipo 2.

Además permitirá valorar, según el doctor, la comorbilidad de los pacientes, su seguimiento, el tratamiento que reciben, así como su grado de satisfacción, de educación diabetológica o el coste que supone la atención de estos enfermos.

A esta iniciativa de investigación de la SEMI se une un **estudio,** ya en desarrollo, para valorar los marcadores de riesgo vascular en pacientes diabéticos que padezcan una lesión de un órgano importante como el corazón o el riñón, ya sea sintomática o asintomática.

Asimismo, la SEMI promueve ensayos clínicos (fundamentalmente sobre el manejo terapéutico), así como investigaciones sobre la genética de la diabetes tipo 2 o la relación de esta patología con el síndrome metabólico y con otros factores de riesgo cardiovascular, entre otros.

Por otro lado, el presidente de la SEMI, **Pedro Conthe**, destacó que los médicos de los servicios de medicina interna atienden a aproximadamente de un 38 a un 40 por ciento de los pacientes diabéticos, por lo que calificó el papel de este especialista de 'clave'.

El perfil del paciente diabético atendido por el internista es el de un ciudadano de edad avanzada con comorbilidad aguda o crónica que ingresa en los servicios de medicina interna por su patología asociada o por una complicación de la diabetes.