



THE ECOTIMES

13/2/01

Expertos recomiendan a los diabéticos bajas dosis de Aspirina diarias para reducir el riesgo cardiovascular

SALUD

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Expertos norteamericanos recomendaron ayer el consumo diario de bajas dosis de ácido acetilsalicílico (comercializado por Bayer como 'Aspirina') en dosis de entre 81 miligramos y 325 miligramos, a los enfermos de diabetes, para reducir el riesgo cardiovascular, según informó ayer Bayer.

Según el doctor Henry Ginsberg, director del 'Irvin Center for Clinical Research' de la Universidad de Columbia (Nueva York), "todas las personas diabéticas deberían tomar 'Aspirina' infantil cada día".

Los diabéticos tienen un riesgo de entre 3 y 5 veces más de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular que el resto de la población, ya que esta enfermedad provoca un aumento de los triglicéridos en la sangre, una presencia menor del colesterol HDL, hipertensión y problemas de coagulación, esto es, factores que aumentan el riesgo cardiovascular.

Según los expertos, más del 25 por ciento de los adultos que padecen diabetes también sufren enfermedad cardiovascular, y la mayoría de ellos poseen antecedentes familiares de riesgo, son fumadores, tienen sobrepeso o hipertensión.