O.J.D.: 25068
E.G.M.: No hay datos

SIETE DIAS MEDICOS

Fecha: 12/12/2008
Sección: ACTUALIDAD
Páginas: 32

Actuaciones novedosas en diabetes tipo 2

Vildagliptina (Galvus®), un nuevo fármaco de la familia de la DPP-4 que actúa sobre la disfunción de los islotes pancreáticos y restaura la capacidad natural del organismo para aumentar la insulina y disminuir el glucagón, y vildagliptina más metformina (Eucreas®), la primera combinación fija de un inhibidor de la DPP-4 junto con metformina, ya están disponibles en nuestro país.

El novedoso mecanismo de acción de vildagliptina, que actúa sobre las células que producen la insulina y modifica la resistencia a ésta sin provocar hipoglucemias, añadido a su favorable perfil de seguridad cardiovascular y de tolerabilidad en pacientes con insuficiencia renal leve/moderada, abre prometedoras expectativas en el tratamiento de la diabetes tipo 2.

Para Ramón Gomis, del servicio de endocrinología del Hospital Clínic de Barcelona, la ventaja de vildagliptina en combinación con otros fármacos es que aquélla puede asociarse «perfectamente al tratamiento de base de la diabetes tipo 2, que es metformina. «El hecho de que se dé en dos dosis, se pueda asociar a metformina y no actúe sobre la resistencia de insulina exclusivamente como aquélla, sino sobre el mantenimiento de las células que producen insulina, que son las que condicionan la historia natural de la diabetes, puede ser una ventaja añadida y nos puede permitir que con esta combinación doble no sea necesario un tercer tratamiento», sostiene.

Los estudios realizados ponen de manifiesto que más de la mitad de los pacientes que actualmente toman medicamentos para tratar su diabetes tipo 2 siguen sin alcanzar los objetivos en cuanto a la glucemia, y que con frecuencia se ha de recurrir a la terapia combinada por el empeoramiento progresivo del control de la glucemia durante la evolución natural de la enfermedad.

En los estudios clínicos, la probabilidad de lograr el control de la glucemia en los pacientes no controlados de forma adecuada con metformina fue cuatro veces mayor al añadir vildagliptina que al añadir un placebo. Además, la administración de vildagliptina junto con metformina dio lugar a reducciones adicionales de la glucemia del 1,1% cuando se determinó según los valores de la HbA_{1c}.